DESINFEKTIONSMITTEL
BIOZID PT2 & PT4

UMONIUM®38
MASTER FOOD

✓ FORMEL OHNE
- ➜ CMR*-KOMPONENTE
- ➜ ENDOKRINEN-DISRUPTOR

✓ H.A.C.C.P. verträglich

NSF
Nonfood Compounds
D1

“ Ein nicht-korrosiver Desinfektionsreiniger ”

Bereits ab 1 Minute aktiv, ist UMONIUM38® MASTER FOOD eine neue pH-neutrale, farblose Lösung, die nach dem Abspülen keinerlei Rückstände hinterlässt. Entwickelt für Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auch nicht, geeignet zur Desinfektion von Gemeinschaftsküchen in der Lebensmittelindustrie (Spülmaschinen mit Förderbändern, Zubereitungstische usw.), für Verarbeitungsstandorte (Abrennungen für industrielle Kaltbereiche, Mischtanks, Schneidetische, Förderbänder in direktem Kontakt mit Lebensmitteln, Abfüllmaschine für Getränkeflüssigkeiten usw.) Insbesondere empfohlen zur Bekämpfung von *Salmonella typhimurium* und wirksam gegen Bakteriophagen.

UMONIUM38® MASTER FOOD ist ein Biozid-Produkt. Seien Sie vorsichtig mit antiseptischen Produkten. Lesen Sie vor der Verwendung das Etikett und die Informationen zum Produkt durch.

* Krebserregend, mutagen oder reprotoxisch

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
mastered disinfection

MADE IN BELGIUM

UMONIUM®38
MASTER FOOD

1l Konzentrat ergibt 200 l verdünnte Lösung (0,5 %).

✓ FORMEL OHNE
- ➜ CMR*-KOMPONENTE
- ➜ ENDOKRINEN-DISRUPTOR

✓ H.A.C.C.P. verträglich

NSF
Nonfood Compounds
D1

ANWENDUNGSBEREICH
Desinfektionsmittel für Oberflächen und Ausrüstungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder nicht.

ZUSAMMENSETZUNG
Alkyl-(C12-16)-dimethylbenzyl-ammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)). 99 g/l.

NORMATIVE STANDARDS
- ISO 9001:2015 sorgt für Qualitätskonsistenz und Rückverfolgbarkeit
- Einhaltung der Biozidverordnung Nr. 528/2012
- Empfohlen für HACCP-Verfahren

GEBRAUCHSANLEITUNG
Desinfektion: Bereiten Sie eine 2,5 %ige Lösung vor (25 ml/1 l Trinkwasser bei Raumtemperatur). Gut mischen. Die Lösung ist nun bereit zur Anwendung. Durch feuchtes Abwischen oder Einweichen (in einem Bad, das mindestens einmal am Tag gewechselt wird) der zu desinfizierenden Objekte Kontaktzeit: 15 Min. Bei Gegenständen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, wird dringend empfohlen, sie nach der Behandlung mit Trinkwasser abzuspülen. Anwendungsgeräte mit Trinkwasser spülen.

EIGENSCHAFTEN
- Biozid PT2 & PT4
- Reinigungsmittel – Entfetter – Breitspektrum-Desinfektionsmittel
- Ungiftig: DL_{50} (Ratte 5840 mg/kg), keine gefährlichen Dämpfe
- Nicht korrosiv: pH-neutral
- Verdünntes Produkt reizt die Haut nicht (keine transdermale Toxizität)
- Enthält keine Aldehyde, Peroxide, Biguanide oder andere krebserregende, mutagene oder reprotoxische Bestandteile
- Nicht gerinnungsaktiv
- Nicht brennbar
- Bakterizid (einschließlich *S. typhimurium*), levurizid, mycobakterizid und viruzid
- 100 % kompatibel auf Glasfaser, Gummi, Polycarbonat, Acryl, Glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, Neopren, Latex, Silikon, Farbe, Edelstahl 410
- Wirksam, schnell und leistungsfähig (löst Blut)
- Wirksam bei Anwesenheit von organischen Stoffen
- Schnelligkeit der Desinfektion: 15 Min.
- Bleibt auf der nicht abgespülten Oberfläche haften (bakteriostatischer Film)
- Ohne Rückstände nach dem Abspülen
- Stabilität: 36 Monate nach der Herstellung
- HACCP-Bewertung
- NSF-Registrierung
- Farblos - geruchlos

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	KARTON	ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
PF 12504	Dosierfläschchen 125 ml	24 x 125 ml	PF 12507	25 l-Behälter
PF 12505	Dosierfläschchen 1 l	12 x 1 l	PF 12508	200 l-Fass
PF 12506	5 l-Behälter mit Pumpe	4 x 5 l	PF 12509	1000 l-IBC

EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5 %	1 Stück
EMB 0013 - 2,5 %	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 2,5 %	1 Stück

ANWENDUNGSVERFAHREN

PHASE ❶: DESINFEKTION

2,5%ige Lösung: 25 ml/1 l Wasser

Desinfizieren/ Einweichen

15 Minuten einwirken lassen

Bei Bedarf mit Trinkwasser abspülen*

* Bei Gegenständen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, wird dringend empfohlen, sie nach der Behandlung mit Trinkwasser abzuspülen.

TECHNISCHE DATEN

Normen	Zielorganismen		Kontaktzeit (Min.)	
			0,5%	2,5%
EN 1276	BAKTERIEN	*S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli*	20	10
		E. cloacae, S. typhimurium, L. brevis	-	15
EN 13697		*S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli, E. cloacae, S. typhimurium, L. brevis*	15	15
EN 13697	HEFEN	*C. albicans*	20	15
EN 1650			10	10
		S. cerevisiae	-	15
EN 14476	VIREN	Adenoviren, Noroviren, Polioviren	10	10
		Vacciniaviren	-	5
EN 13610		Bacteriophagen P001, Bacteriophagen P008	-	15
EN 14348	MYCOBAKT.	*M. avium, M. terrae*	20	10
EN 14563			60	10

* Karzinogen, mutagen oder reprotoxisch

FP00373 DE - Ed. 3.3 - 06/2023 - *Unverbindliche Produktabbildungen.*

UMONIUM®38® ist eine von Laboratoire Huckert's International hinterlegte Marke